


## Manuel d'utilisation

### Taltz® 80 mg, solution injectable en seringue pré-remplie

ixékizumab



Avant d'utiliser votre seringue pré-remplie :


#### Informations importantes

- Avant d'utiliser la seringue pré-remplie Taltz, lisez et suivez attentivement les instructions étape par étape. Conservez ce manuel d'utilisation et consultez-le en cas de besoin.
- La seringue pré-remplie contient 1 dose de Taltz. La seringue est à USAGE UNIQUE EXCLUSIVEMENT.
- La seringue ne doit pas être secouée.
- Votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère pourra vous aider à choisir la partie du corps où injecter votre dose.
- Lisez la notice de Taltz à l'intérieur de cette boîte pour avoir plus d'informations sur ce médicament.

#### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**Avant d'utiliser la seringue pré-remplie Taltz, lisez et suivez attentivement les instructions étape par étape.**

## Légende des différents éléments



### 1 PRÉPARATION

**1a Sortez la seringue du réfrigérateur.** Laissez le capuchon de l'aiguille sur la seringue jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection. **Attendez 30 minutes** pour laisser la seringue se réchauffer à température ambiante avant de l'utiliser.




N'utilisez **PAS** de sources de chaleur telles qu'un micro-ondes, de l'eau chaude ou la lumière directe du soleil pour réchauffer le médicament.

**1b Rassemblez les éléments nécessaires à l'injection :**

- 1 compresse imbibée d'alcool
- 1 morceau de coton ou de gaze
- 1 collecteur pour objets piquants ou coupants pour y jeter les seringues

1c



**Vérifiez que la partie extérieure de la seringue pré-remplie n'est pas abîmée.** Laissez le capuchon de l'aiguille sur la seringue jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection. Vérifiez l'étiquette. Assurez-vous que le nom Taltz figure sur l'étiquette.


Le médicament à l'intérieur de la seringue doit être limpide. Sa couleur peut varier d'incolore à légèrement jaune.

Dans les cas suivants, **N'UTILISEZ PAS** la seringue et jetez-la selon les recommandations :

- La date de péremption est dépassée.
- La seringue semble abîmée.
- Le médicament est trouble, de couleur marron ou contient de petites particules.

1d **Lavez-vous les mains avant de procéder à l'injection du médicament.**

1e



**Choisissez le site d'injection.**

Vous pouvez effectuer l'injection dans le ventre (abdomen), la cuisse ou l'arrière de votre bras. Pour l'injection dans le bras, vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider.


**N'injectez PAS** le produit dans des zones où la peau est sensible, présente des hématomes, est rouge ou dure, présente des cicatrices ou des vergetures. **N'injectez PAS** le produit à moins de 2,5 cm autour du nombril.

**Alternez les sites d'injection.** **N'injectez PAS** le produit à chaque fois au même endroit. Par exemple, si la dernière injection a été faite dans la cuisse gauche, vous pouvez faire l'injection suivante dans la cuisse droite, le ventre ou à l'arrière de l'un des deux bras.

1f **Préparez votre peau.** Nettoyez votre peau avec une compresse imbibée d'alcool. Laissez sécher naturellement le site d'injection avant de procéder à l'injection.

## 2 INJECTION

2a




**Retirez le capuchon de l'aiguille et jetez-le.**

**NE** remettez **PAS** le capuchon sur l'aiguille ; vous risqueriez d'abîmer l'aiguille ou de vous blesser accidentellement.


**NE** touchez **PAS** l'aiguille.

2b




**Pincez doucement la peau et maintenez un pli de peau dans lequel l'injection sera effectuée.**


2c



**Insérez l'aiguille en l'inclinant de 45 degrés.** Laissez-la aller doucement dans votre peau. Maintenez bien l'aiguille en place.



2d



### **Poussez sur le piston.**

Poussez lentement sur le piston jusqu'à ce que la totalité du médicament ait été injectée. Le piston gris de la seringue doit être poussé jusqu'au fond de la seringue. Retirez doucement l'aiguille de votre peau.

Appuyer avec un morceau de coton ou de gaze sur le site d'injection. **NE frottez PAS** le site d'injection pour ne pas provoquer d'ecchymoses. Il peut y avoir un léger saignement. C'est normal.

**Vous devez voir la tige verte du piston dans le corps de la seringue lorsque l'injection est terminée.**

3

**FIN**

3a



### **Jetez la seringue pré-remplie utilisée.**

**NE** remettez **PAS** le capuchon sur l'aiguille. Jetez la seringue dans un collecteur pour objets piquants ou coupants ou selon les recommandations de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre infirmier/ère.

### **Quand vous jetez des seringues et le collecteur pour objets piquants ou coupants :**

- Jetez la seringue dans un collecteur pour objets piquants ou coupants ou selon les recommandations de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre infirmier/ère.
- Ne recyclez pas le collecteur pour objets piquants ou coupants quand il est plein.
- Demandez à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère comment jeter les médicaments que vous n'utilisez plus.

## Conseils de sécurité

- Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour utiliser la seringue pré-remplie, contactez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Si vous avez des problèmes de vue, N'utilisez PAS la seringue pré-remplie sans l'aide d'une personne formée à son utilisation.
- NE partagez PAS et NE réutilisez PAS la seringue pré-remplie Taltz. Vous risqueriez de transmettre ou de contracter une infection.
- Tenez la seringue hors de la vue et de la portée des enfants.
- Si vous n'avez pas de collecteur pour objets piquants ou coupants, demandez à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère où vous pouvez vous en procurer un.

## Foire aux questions

### Q. Que dois-je faire si je vois des bulles d'air dans la seringue ?

R. Il est normal que la seringue contienne parfois des bulles d'air. Taltz est injecté sous votre peau (injection sous-cutanée). La présence de bulles d'air ne pose pas de problème pour ce type d'injection. Cela n'est pas dangereux et n'a pas d'effet sur la dose.

### Q. Que faire s'il y a une goutte de liquide au bout de l'aiguille quand je retire le capuchon ?

R. La présence d'une goutte de liquide au bout de l'aiguille est normale. Cela n'est pas dangereux et n'a pas d'effet sur la dose.

### Q. Que faire si je n'arrive pas à pousser sur le piston ?

R. Si le piston est coincé ou abîmé :

- **ARRÊTEZ** d'utiliser la seringue.
- Retirez l'aiguille de votre peau.

### Q. Comment savoir si l'injection est terminée ?

R. Lorsque l'injection est terminée :

- La tige verte du piston doit être visible dans le corps de la seringue.
- Le piston gris de la seringue doit être poussé au maximum jusqu'au fond de la seringue.

**Lisez l'intégralité du manuel d'utilisation et de la notice à l'intérieur de la boîte pour plus d'informations sur ce médicament.**