


# Manuel d'utilisation

## Emgality® 120 mg, solution injectable en seringue pré-remplie

Galcanézumab

Voie sous-cutanée



Avant d'utiliser votre seringue pré-remplie (seringue) :


### Informations importantes

- Votre médecin ou votre infirmier/ère doit vous montrer comment préparer et injecter Emgality avec la seringue. Ne vous injectez pas vous-même, ou n'injectez pas Emgality à quelqu'un d'autre avant qu'un professionnel de santé ne vous ait montré comment le faire.
- Conservez ce manuel et consultez-le si nécessaire.
- Chaque seringue est **À USAGE UNIQUE EXCLUSIVEMENT**. Ne partagez pas et ne réutilisez pas votre seringue. Sinon, vous risqueriez de transmettre ou de contracter une infection.
- Votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère peut vous aider à choisir la partie du corps où injecter votre dose. Vous pouvez également lire la rubrique « **Choisir son site d'injection** » de ce manuel pour vous aider à choisir le site d'injection qui vous convient le mieux.
- Si vous avez des problèmes de vue ou d'audition, n'utilisez pas la seringue sans l'aide d'un personnel soignant.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**Avant d'utiliser la seringue EMGALITY, lisez et suivez attentivement toutes les instructions étape par étape.**

## Éléments de la seringue Emgality



## Avant de commencer

### Sortez la seringue du réfrigérateur

Remettez l'emballage d'origine contenant les seringues inutilisées dans le réfrigérateur.

**Laissez le capuchon de l'aiguille en place jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection.**

**Ne secouez pas** la seringue.

Pour une injection plus confortable, laissez la seringue se réchauffer à température ambiante pendant 30 minutes avant de l'utiliser.

**Ne mettez pas** votre seringue au micro-ondes, ni faire couler de l'eau chaude dessus ni la laisser à la lumière directe du soleil.


### Inspectez la seringue et le médicament

Assurez-vous d'avoir le bon médicament. Le médicament à l'intérieur doit être limpide. Il peut être incolore à légèrement jaune.

**N'utilisez pas** la seringue, et jetez-la conformément aux directives de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère si :

- elle semble endommagée
- le médicament est trouble, présente une coloration anormale ou contient de petites particules
- la date de péremption imprimée sur l'étiquette est dépassée
- le médicament est congelé.

**Date de péremption**




## Préparez-vous pour l'injection

Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau avant de vous injecter Emgality. Vérifiez que vous avez un conteneur à objets tranchants à proximité immédiate.

## Choisissez votre site d'injection


Votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère peut vous aider à choisir le site d'injection qui vous convient le mieux.



- **Vous** pouvez vous injecter le médicament dans le ventre (abdomen) ou la cuisse. Ne pas injecter à moins de 5 centimètres du nombril.
- Une **autre personne** peut effectuer l'injection à l'arrière de votre bras ou dans une fesse.
- N'effectuez **pas** l'injection au même endroit que précédemment. Par exemple, si la première injection a été effectuée dans l'abdomen, l'injection suivante pourra être faite dans une zone différente de l'abdomen.
- **Nettoyez et séchez la peau du site d'injection avant d'effectuer l'injection.**


## 1 Retirez le capuchon

- Laissez le capuchon de l'aiguille en place jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection.
- Quand vous êtes prêts pour l'injection, dévissez le capuchon et jetez-le dans la poubelle.
- **Ne remettez pas** le capuchon sur l'aiguille – vous risqueriez d'endommager l'aiguille ou de vous blesser accidentellement.
- **Ne touchez pas** l'aiguille.




## 2 Insérez

- Pincez doucement la peau et maintenez un pli de peau dans lequel l'injection sera effectuée.
- Insérez l'aiguille en l'inclinant de 45 degrés.




## 3 Injectez

- Avec le poussoir, poussez lentement sur le piston jusqu'à ce que la totalité du médicament soit injectée.
- Le piston gris de la seringue doit être poussé au fond de la seringue.



- Vous devez voir la tige turquoise du piston dans le corps de la seringue lorsque l'injection est terminée comme sur la photo.
- Retirez l'aiguille et relâchez doucement la peau.
- **Ne remettez pas** le capuchon sur l'aiguille.



Tige turquoise du piston

Piston gris de la seringue

## Après injection de votre médicament

### Jetez la seringue

NE remettez PAS en place le capuchon.  
Jetez la seringue dans un conteneur à objets piquants ou tranchants ou conformément aux recommandations de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.



**Lorsque vous jetez la seringue et le conteneur à objets piquants ou tranchants :**

- Ne recyclez pas le conteneur à objets piquants ou tranchants lorsqu'il est plein.
- Demandez à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère comment jeter les médicaments que vous n'utilisez plus.

### Questions fréquemment posées

**Q. Que dois-je faire si je vois des bulles d'air dans ma seringue Emgality ?**

**R.** La présence de bulles d'air est normale. Emgality est injecté sous la peau (injection sous-cutanée).

**Q. Que faire s'il y a une goutte de liquide sur la pointe de l'aiguille lorsque je retire le capuchon de l'aiguille ?**

**R.** Il est normal de voir une goutte de liquide sur la pointe de l'aiguille.

**Q. Que faire si je n'arrive pas à pousser sur le piston ?**

**R.** Si le piston est coincé ou endommagé :

- **Arrêtez** d'utiliser la seringue
- Retirez l'aiguille de votre peau
- Jetez la seringue et prenez-en une nouvelle

**Q. Que dois-je faire s'il y a une goutte de liquide ou de sang sur ma peau après l'injection ?**

**R.** Ceci est normal. Appuyez avec un morceau de coton ou une compresse de gaze sur le site d'injection. Ne frottez pas le site d'injection.

**Q. Comment puis-je savoir si mon injection est terminée ?**

**R.** Lorsque l'injection est terminée :

- La tige turquoise du piston doit être visible à travers le corps de la seringue.
- Le piston gris de la seringue doit être poussé au fond de la seringue.

**Lisez l'intégralité de la notice d'Emgality contenue dans cette boîte pour en savoir plus sur votre médicament.**